

# Pluryal 説明書兼同意書

## ■ Pluryal®の組成と効能

Pluryal® SILK（プルリアル シルク）は、ポリヌクレオチドゲルで、注入剤として使用するものです。ポリヌクレオチドは、サーモン・マスから抽出される天然由来の物質でその生化学的・粘弾性的特性により、保湿や肌に栄養を与えることに優れており、主に皮膚の硬さ、しなやかさ、張りの改善、傷の改善に使用します。また、額、目周り、口周り、顔、首、デコルテ、腹部、臀部、大腿部など、皮膚のどの部位にも使用できます。

※全製品、欧州の CE 認証（日本では厚生労働省）を取得している安全な注入剤です

## ■ 施術した際に発現する可能性のある症状・反応

- ・処置後の出血、浮腫、腫れない紅斑（1週間以内に消失することがほとんど）。
- ・稀に治療部位の炎症反応（赤み、腫れ、痛み、かゆみ）、血腫、圧痛が起きることがあり、注射の直後、もしくは2～6週間後に出ることもあります。
- ・1週間以上続く副作用は、医師に報告し、適切な治療を受けてください。
- ・治療部位や注入方法にもよりますが、初回治療（3週間間隔で数回注入）を行った場合、Pluryal Densifier 製品の効果は6～12ヶ月ほど持続するとされていますが、この期間は患者様の肌の状態やケア、ケースによって増減することがあります。

## ■ 施術後の注意点

- ・施術当日の洗顔は可能ですが、摩擦を避けて優しく洗ってください。
- ・メイクは施術翌日から可能です。
- ・施術当日の飲酒、喫煙、サウナ、激しい運動は避けてください。
- ・施術部位へのマッサージは1週間程度避けてください。
- ・治療後2週間は、肌への刺激が強い美容処置はしないようご注意ください。

## ■ 禁忌事項

- ・製品に過敏症の既往歴がある方（全製品）
  - ・魚、魚卵アレルギーの方（SILKのみ）※そのほか、医師が禁忌と判断した患者様
- なお、以下の患者様に対する本製品の使用に関する臨床データがないため、原則として治療は推奨されませんが、最終的な治療の可否については医師にご相談ください。
- ・自己免疫疾患の患者様（全製品）
  - ・妊娠中・授乳中の患者様（全製品）
  - ・18歳未満の患者様（全製品）

## ■ 以下の患者様は、治療の可否を医師にご相談ください。

心疾患 糖尿病 てんかん 肝炎 感染症 アトピー ケロイド体質  
炎症性ニキビ 金属挿入部、プロテーゼ、アクアミドなどの注入部位

本同意書の項目を確認し、本治療の効果・発現する可能性のあるリスクについて承諾します。

同意日：                    年                    月                    日

氏 名： \_\_\_\_\_