【セレックＶ同意書】

IPL（Intense Pulsed Light）という光を照射し、少しずつ病変を改善していきます。

【施術前の注意事項】

・眼球の上(まぶた)は施術できません。　・肝斑は悪化する場合がありますので施術はできません。

・他院を含め、3 カ月以内に美容治療を受けた方は必ずお申し出ください。

・色が薄くなる（または消える）事を望まないホクロやアートメイクがある場合は、施術前に教えて下さい。

・ピーリング剤やトレチノイン、ディフェリンの治療をしている方は施術 1 週間前（薬に慣れているいる場合は 3 日前）から使用を中止してください。　施術後の再開は乾燥や刺激症状がなければ即時可能です。

・照射時は、輪ゴムでパチンとはじかれたような感覚があり、照射後は、ほてり感を感じる場合がありますが 、数時間で治まります。冷却することにより軽減します。

【施術できない方（禁忌)】

・免疫抑制疾患、免疫抑制剤を内服中（HIV 感染など)、活性型ヘルペス、またはヘルペスの病歴がある、抗凝固薬を服用中 、光感受性を高めるような薬剤（副作用欄に「光線過敏症」の記載あるもの）を使用または服用中、糖尿病、てんかん、アルコール中毒、鬱血性心疾患などの全身性疾患 、前がん病変、皮膚がん、または皮膚がんの病歴がある、ケロイドの既往がある、重度の各種皮膚疾患または炎症性皮膚疾患、感染性皮膚疾患。1ヶ月以内に日焼けをされた方、施術後 2 週間以内に積極的な日焼けをする予定の方、**金の糸が入っている**、妊娠中授乳中は肌荒れを起こしやすくなるなどお身体の変調を考慮し、施術はできません。

【施術後の注意点】

・シャワーは当日から可能ですが、入浴は翌日から可能です。・施術後はすぐにメイクは可能です。

・照射後に、色素性病変（シミ）の色が一時的に濃くなり、マイクロクラストと呼ばれる軽いかさぶたが形成される場合があります。その場合、 かさぶたが剥がれ落ちるまでに 5～10 日かかることがあります。皮膚を擦ったり、引っ掻くなど無理に剥がすと色素沈着の一因となるのでお控えください。

・毛細血管の治療では、一時的に血管病変が濃くなったり、小さい紫斑が現れる場合があります。

・治療後まれに、火傷や色素沈着などの副作用が生じる可能性があります。

・施術後は肌の日焼けや、日焼けによるダメージを受けやすくなります。日光への過度の暴露を避け、日焼け止め(＊SPF30 以上を推奨)を使用してください。

・照射は触るなどの強い刺激を与えると炎症が促進され、副作用が発生する可能性があります。照射後から数日間は刺激の強い化粧品や洗顔料などを使用しないでください。

・一時的に肌が乾燥しやすくなります。化粧水、乳液、等で通常よりもしっかりと保湿をしてください。

・トリートメント後の 2 週間は積極的なピーリング、ワックス脱毛、酸の入った製品の使用を避けてください。

【副作用】

・治療後まれに、火傷や色素沈着などの副作用が生じる可能性があります。副作用または合併症が生じた場合必要な処置を行いますので　当院の指示に従ってください。すぐにご連絡をお願いいたします。

・治療には副作用が発症する可能性があることもご理解いただいた上でお受けください。

・治療効果がご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でも治療費の返還はありません。

【施術回数・間隔】

・5 回を 1 クールとして治療をおこないます。　・施術直後からくすみ、肌質の改善、化粧のノリが良くなるなどの効果を実感できることもありますが、人によっては全く外面上の変化が 見られない場合もあります。

・次回の施術間隔は 1 カ月空けてください。

私は、その方法、効果、副 作用などについて詳しい説明を聞き、理解しました。また、禁忌事項に該当する項目はありません。 この施術をうけることに同意いたします。

年　月　日 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿